

Liebe Patientin,

Sie haben sich zur Verhütung für Einnahme einer Anti-Baby-Pille entschieden und haben damit ein sicheres Verhütungsmittel gewählt. Aber eine „Pille“ ist auch ein Medikament.

### **Hier haben wir einige Informationen zum Thema Pille und das Risiko für Blutgerinnsel.**

Herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Alle kombinierten hormonalen Kontrazeptiva, wie auch das Ihnen verschriebene Präparat, erhöhen das Risiko für die Bildung eines Blutgerinnsels. Das Gesamtrisiko für das Auftreten eines Blutgerinnsels unter Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazeptivums ist gering, allerdings können Blutgerinnsel schwerwiegend und in sehr seltenen Fällen sogar tödlich sein. Es ist besonders wichtig, dass Sie erkennen, wann Sie ein höheres Risiko für ein Blutgerinnsel haben und auf welche Anzeichen und Symptome Sie achten sollten, und welche Maßnahmen Sie dann ergreifen müssen.

### **Wann ist das Risiko für die Bildung eines Blutgerinnsels am größten?**

-im ersten Jahr der Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazeptivums ( auch dann, wenn Sie nach einer Unterbrechung von 4 oder mehr Wochen die Anwendung wieder aufnehmen )

-wenn Sie stark übergewichtig sind

- wenn Sie älter als 35 Jahre sind

-wenn Sie rauchen

- wenn bei einem Ihrer nächsten Angehörigen in relativ jungen Jahren ( d.h. jünger als ca. 50 Jahre) ein Blutgerinnsel aufgetreten ist ( Gefäßverschlüsse im

Bein ( Thrombose), in der Lunge ( Lungenembolie) oder anderen Organen, Schlaganfall oder Herzinfarkt)

-wenn Sie vor wenigen Wochen entbunden haben

Wenn Sie rauchen und älter als 35 Jahre sind, wird Ihnen dringend geraten, mit dem Rauchen aufzuhören oder ein nicht-hormonales Verhütungsmittel anzuwenden.

### **Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie eines der folgenden Anzeichen oder Symptome bemerken:**

-starke Schmerzen oder Schwellungen eines Beins, die begleitet sein können von Druckschmerz, Erwärmung oder Änderung der Hautfarbe des Beins, z.B. aufkommende Blässe, Rot- oder Blaufärbung. Sie könnten an einer **tiefen Beinvenenthrombose** leiden.

-plötzliche unerklärliche Atemlosigkeit/Atemnot oder schnelle Atmung; starke Schmerzen in der Brust, welche bei tiefem Einatmen zunehmen können; plötzlicher Husten ohne offensichtliche Ursache, bei dem Blut ausgehustet werden kann. Sie könnten an einer schweren Komplikation einer tiefen Beinvenenthrombose leiden, die **Lungenembolie** heißt. Diese entsteht, wenn das Blutgerinnsel vom Bein in die Lunge wandert.

-Brustschmerz (meist plötzlich auftretend ), aber manchmal auch nur Unwohlsein, Druck, Schweregefühl, vom Oberkörper in den Rücken, Kiefer, Hals und Arm ausstrahlende Beschwerden, zusammen mit einem Völlegefühl, Verdauungsstörungen oder Erstickungsgefühl, Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen oder Schwindelgefühl. Sie könnten an einem **Herzanfall** leiden.

-Schwäche oder Taubheitsgefühl des Gesichtes, Arms oder Beins, die auf einer Körperseite besonders ausgeprägt ist; Sprach- oder Kopfschmerzen/Migräne. Sie könnten einen **Schlaganfall** haben

### **Achten Sie aufmerksam auf die Symptome eines Blutgerinnsels, und fragen Sie Ihren Arzt nach Vorbeugungsmaßnahmen zur Verhinderung von Blutgerinnseln, besonders wenn Sie:**

-gerade operiert wurden

-über einen längeren Zeitraum bettlägerig gewesen sind (z.B. aufgrund einer Verletzung oder Krankheit, oder weil ein Bein eingegipst ist)

-auf einer längeren Reise gewesen sind (z.B. Flüge über 4 Stunden)

### **Denken Sie daran, Ihren Arzt einschließlich den behandelnden Chirurgen oder die Krankenschwester darüber zu informieren, dass Sie ein kombiniertes hormonales Kontrazeptivum anwenden, wenn Sie:**

-operiert werden müssen oder eine Operation hatten, falls Sie längere Zeit bettlägerig sind oder eine längere Reise (speziell mit längeren Flugzeiten) planen.

-von Angehörigen der Gesundheitsberufe gefragt werden, ob Sie irgendein Arzneimittel nehmen.

Nähere Einzelheiten finden Sie in der Gebrauchsinformation oder unter [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

Wenn Sie in Zusammenhang mit der Anwendung Ihres kombinierten hormonalen Kontrazeptivums vermuten, eine Nebenwirkung zu erleiden, können Sie dieses gerne uns oder dem Apotheker mitteilen oder direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn.



— PRAXISVIRCHOWSTRASSE —  
Gynäkologische Gemeinschaftspraxis

**Dr. med. Brigitte Klein**  
**Dr. med. Susanne Classen**  
**Beate Rensinghoff**  
**Sabine Schmidt**



**Pille**

Virchowstr. 10                      44263 Dortmund  
Tel.: 0231-941188-0   Fax.: 0231-941188-33  
email:                    [info@praxis-virchowstrasse.de](mailto:info@praxis-virchowstrasse.de)  
homepage:                [www.praxis-virchowstrasse.de](http://www.praxis-virchowstrasse.de)